LABORATOIRE BIOSAGA	**Helicobacter pylori - Test respiratoire a l'uree (ex : Helikit)**	**GEN-PRA-INS042** Version : **6.0** Page 1 / 1 Date d'application : 2019-01-01
Rédacteur :	GRANDVALET Sylvie	Date : 2018-12-28
Vérificateur :	GRANDVALET Sylvie	Date : 2018-12-28
Approbateur :	GAMBERT Nadège	Date : 2018-12-31

RECOMMANDATIONS PATIENT

Principale indication :

Ce prélèvement permet de mettre en évidence la présence dans l'estomac d'Helicobacter pylori, bactérie responsable de l'ulcère gastroduodénal.

Préparation :

- Vous devez être **au repos, à jeun depuis plus de 6 heures sans manger, sans boire, ni fumer, ni mâcher de chewing-gum**
- Cet examen requiert votre présence au laboratoire pendant 40 minutes, il consiste à recueillir l'air expiré à T0 et à T30 minutes après ingestion d'urée marquée.
- Lors de la réalisation du test, **veuillez apporter le coffret Helikit/Helicobacter test INFAI** acheté préalablement à la pharmacie.
- En cas de vomissement pendant le déroulement du test, il s'avère nécessaire de renouveler celui-ci (pas avant le lendemain)

Arrêt du traitement :

Familles traitements	Médicaments	Arrêt avant prélèvement
Antibiotiques (par voie générale ou pour certains, oculaire)		**minimum 4 semaines**
Inhibiteurs de la pompe à protons (anti sécrétoire)	oméprazole : Mopral®…, ésoméprazole : Inexium®…, rabéprazole : Pariet®…	**minimum 2 semaines**
Antiacides et pansements gastro-intestinaux	Maalox®, Rennie®,Smecta®, Gaviscon®…	**minimum 24h**

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Nom : ……Prénom : ……...Date de naissance :……..…

Traitement antibiotique : ☐ Oui ☐ Non
Si oui débuté le : ……..…..…… Arrêté le : ……..……....
Nom de l'antibiotique : ……

Traitement anti-sécrétoire : ☐ Oui ☐ Non
Si oui débuté le : ……..…… Arrêté le : ……..
Nom de l'anti sécrétoire : ……..……...

Traitement anti-acides et pansement gastro-intestinal : ☐ Oui ☐ Non
Si oui débuté le : …… Arrêté le : ……..
Nom du traitement : ……...

Avez-vous subi une opération chirurgicale qui a supprimé totalement ou partiellement votre estomac ?
☐ Oui ☐ Non
(Si Oui : Ce test ne permet pas de déterminer avec certitude si votre estomac est infecté par Hélicobacter Pylori.)