



SELARL BIOSAGA

Examen CytoBacteriologique des Urines, Examen Cytochimique des Urines

GEN-PRA-INS001

Version : 7.0

Page 1 / 1

Date d'application : 2017-03-04

Rédacteur :

SOHIER Gwenaëlle

Date : 2017-03-03

Vérificateur :

GRANDVALET Sylvie

Date : 2017-03-03

Approbateur :

GAMBERT Nadège

Date : 2017-03-03

Recueil



RECOMMANDATIONS PATIENT

- Recueillir les urines **avant toute prise d'antibiotique (Sauf avis médical contraire)**.
- Recueillir de préférence les urines du matin; en cas d'impossibilité, il est préférable de recueillir les urines au minimum 4 heures après une miction.
- Procéder à un lavage hygiénique des mains.
- Procéder à une **toilette soigneuse**, avec la lingette fournie ou du savon, de la région vulvaire chez la femme, du méat chez l'homme.
- **Eliminer le premier jet urinaire** dans les toilettes et ne recueillir que les urines de milieu de miction, en prenant soin de ne pas toucher le bord supérieur du flacon.
- Fermer hermétiquement le flacon
- Identifier le flacon en précisant bien l'heure du recueil
- Apporter le flacon **immédiatement** au laboratoire accompagné de la prescription et de la fiche de renseignements dûment remplie (**conservation inférieure à 2 heures à température ambiante et maximum 24 heures au réfrigérateur**)

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Date du recueil :

Heure du recueil :

Conservation des urines au réfrigérateur :

Oui Non

• **Recueil des urines :** Au laboratoire A domicile

- Milieu de jet 1^{er} jet
- Sonde à demeure Sondage aller-retour
- Dispositif collecteur (poche pédiatrique, collecteur pénien,..)

• **Traitement antibiotique :** Oui Non

Nom de l'antibiotique :

- En cours Après recueil Contrôle après traitement

• **Renseignements divers :**

- Brûlures, douleurs à la miction Fièvre
- Envie fréquente d'uriner Absence de symptômes
- Grossesse diabète
- Chimiothérapie Hospitalisation récente
- Procédure urologique invasive programmée (chirurgie, biopsie, cystographie...)
- Chirurgie urologique récente
- Autres :

Dépôt au laboratoire

Apporter le recueil au laboratoire dans les 2 heures suivant le recueil, au-delà, le conserver au **réfrigérateur 24 heures maximum**.

Collecte

Préciser heure du recueil – heure de dépôt au lieu de collecte.

Réservé au Laboratoire :

Heure de percutage du tube borate:

Par :