SELARL BIOSAGA	**Spermogramme / Spermoculture**	**GEN-PRA-INS006** Version : **6.0** Page 1 / 1 Date d'application : 2017-02-17
Rédacteur :	CORDELLE Stephanie	Date : 2017-02-14
Vérificateur :	GRANDVALET Sylvie	Date : 2017-02-14
Approbateur :	GAMBERT Nadège	Date : 2017-02-16

Préconisations	Spermogramme : Le prélèvement doit être effectué après une abstinence sexuelle de **2 à 8 jours**. (pour permettre interprétation correcte des résultats) Il ne faut pas utiliser de préservatif.
Recueil 	1- **<u>Sur rendez-vous uniquement le matin</u>** (seulement pour spermogramme) 2- **<u>Modalité du recueil au laboratoire</u>** : - Uriner avant de commencer le recueil de sperme (attention : si une spermoculture est prescrite, il faut recueillir le 1er jet urinaire dans un flacon pour recherche Chlamydiae et Gonocoque) - Lavage soigneux des mains au savon - Lavage du gland avec la lingette désinfectante remise par le laboratoire. - Après masturbation, recueillir la totalité de l'éjaculât dans le réceptacle stérile mis à disposition par le laboratoire (Ne rien perdre du prélèvement ou le mentionner lors de l'enregistrement du dossier à la secrétaire). - Identifier le réceptacle avec votre nom et prénom. Une fois le recueil réalisé, merci de ne **pas mettre dans le même sachet les documents papiers et le flacon.**
	Renseignements patient
	<u>Patient</u> : - Nom du patient : - Prénom : - Date de naissance : - Heure du recueil : - Nombre de jours d'abstinence sexuelle : - Recueil émis en totalité : oui : non : - Episode récent de fièvre : - Traitement : - Profession : **<u>Conjointe</u>** : - Nom : Prénom :
Dépôt au laboratoire si impossibilité recueil au laboratoire	Apporter le recueil au laboratoire **<u>le plus rapidement possible</u>** dans un délai maximum de 30 MIN à température ambiante.
Collecte	Non réalisable car nécessité de lecture de la mobilité des spermatozoïdes dans la 1ère heure.