

 <p>SELARL BIOSAGA</p>	<h2 style="color: #008080;">Examen CytoBacteriologique des Urines- recueil sur poche sterile urine - patient</h2>	<p>GEN-PRA-INS002 Version : 5.0 Page 1 / 1 Date d'application : 2017-03-29</p>
Rédacteur :	SOHIER Gwenaelle	Date : 2017-03-03
Vérificateur :	GRANDVALET Sylvie	Date : 2017-03-03
Approbateur :	GAMBERT Nadège	Date : 2017-03-28

<p>Recueil</p>  	<p>RECOMMANDATIONS PATIENT</p> <p>Attention : nous vous informons qu'il est souhaitable que ce prélèvement soit réalisé au laboratoire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procéder à un lavage hygiénique des mains du manipulateur. - Procéder à une toilette soigneuse avec la lingette fournie ou du savon, de la vulve, du méat urinaire et du périnée chez la fillette, du méat urinaire et du prépuce chez le petit garçon. - Bien sécher - Poser la poche, en prenant soin de ne pas toucher les bords, la retirer dès l'émission d'urines. - Ne pas laisser en place plus de 30 minutes. <p><i>Passé ce délai, si l'enfant n'a pas uriné, le dispositif est éliminé et remplacé par un neuf.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dès la miction terminée, retirer la poche et coller la partie supérieure adhésive sur elle-même afin de fermer la poche le plus hermétiquement possible puis déposer la poche dans le flacon fourni - <u>Pour l'identification : remplir précisément la partie ci-dessous.</u> et avant toute prise d'antibiotiques (sauf avis médical contraire)
--	---

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

<p><u>Nom :</u></p> <p><u>Prénom :</u></p> <p><u>Date de naissance :</u></p> <p><u>Date du recueil :</u></p> <p><u>Heure du recueil :</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Conservation des urines au réfrigérateur :</u> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Recueil des urines :</u> <input type="checkbox"/> Au laboratoire <input type="checkbox"/> A domicile • <u>Traitement antibiotique :</u> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <p><u>Nom de l'antibiotique :</u></p> <p><input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Après recueil <input type="checkbox"/> Contrôle après traitement</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Renseignements divers :</u> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Brûlures, douleurs à la miction</td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Fièvre</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Envie fréquente d'uriner</td> <td><input type="checkbox"/> Absence de symptômes</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hospitalisation récente</td> <td><input type="checkbox"/> immunodépression</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Autres :</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Brûlures, douleurs à la miction	<input type="checkbox"/> Fièvre	<input type="checkbox"/> Envie fréquente d'uriner	<input type="checkbox"/> Absence de symptômes	<input type="checkbox"/> Hospitalisation récente	<input type="checkbox"/> immunodépression	<input type="checkbox"/> Autres :	
<input type="checkbox"/> Brûlures, douleurs à la miction	<input type="checkbox"/> Fièvre								
<input type="checkbox"/> Envie fréquente d'uriner	<input type="checkbox"/> Absence de symptômes								
<input type="checkbox"/> Hospitalisation récente	<input type="checkbox"/> immunodépression								
<input type="checkbox"/> Autres :									
Dépôt si impossibilité recueil au laboratoire	Apporter le recueil au laboratoire (dans les 2 heures à température ambiante, au-delà, le conserver au réfrigérateur 24 heures maximum).								
Collecte	Préciser heure du recueil – heure de dépôt au lieu de collecte.								
<p style="color: green;"><u>Réservé au Laboratoire :</u></p>									
<u>Heure de percutage du tube borate:</u>	<u>Par :</u>								